RESULTADO DO PEDIDO DE CONTESTAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA

QUESTÃO 02

Resultado da Análise: INDEFERIDA

Justificativa: A Banca Examinadora após análise indefere o pedido de contestação, uma vez que a causa mais comum de hidronefrose neonatal é a obstrução da junção ureteropélvica responsável por cerca de 60% dos casos. A maioria destes casos apresenta hidronefrose fisiológica e transitória, evoluindo para resolução espontânea.
A referência sugerida pela candidata também cita a obstrução de JUP como principal causa da hidronefrose transitória ("A hidronefrose transitória é a causa mais comum de hidronefrose antenatal. Ocorre devido a um processo de maturação insuficiente, causando obstrução transitória na junção pieloureteral ou refluxo transitório na junção ureterovesical").

QUESTÃO 03

Resultado da Análise: INDEFERIDA

Justificativa: A Banca Examinadora após análise indefere o pedido de contestação, uma vez que a audição de um sopro é o meio mais comum de reconhecer a presença de cardiopatia congênita em recém-nascidos, porém sua ausência não exclui as cardiopatias graves, já que muitas anomalias cardíacas ameaçadoras à vida estão associadas a sopro suave ou inexistente.
O sopro cardíaco é a maior causa de encaminhamento para a investigação de cardiopatia congênita.
A resposta incorreta é a alternativa letra B, “na tetralogia de Fallot a cianose de grau variável e a taquipneia leve com frequência manifestam-se logo após o nascimento”, uma vez que a questão solicitou a alternativa incorreta.

QUESTÃO 10

Resultado da Análise: DEFERIDA

Justificativa: A Banca Examinadora após análise defere o pedido de contestação, alterando a alternativa para a alternativa Letra B.

QUESTÃO 11

Resultado da Análise: INDEFERIDA

Justificativa: A Banca Examinadora após análise indefere o pedido de contestação, como o RN recebe complemento com fórmula infantil não se admite o diagnóstico de icterícia pelo leite materno (letra B). Na icterícia do leite materno o RN deveria receber exclusivamente leite materno.Também não se admite o diagnóstico de icterícia pelo aleitamento materno (letra A) pois o RN apresenta ganho ponderal satisfatório.
A resposta correta é realmente a letra C, pois o RN tem mais de 14 dias de vida e mantém icterícia sendo essencial a investigação de colestase neonatal - alerta amarelo.

QUESTÃO 35

Resultado da Análise: INDEFERIDA

Justificativa: A Banca Examinadora após análise indefere o pedido de contestação, uma vez que mais recentemente (2017) o Ministério da Saúde retirou o tratamento do parceiro como critério de tratamento adequado da sífilis congênita. Deve-se considerar o uso de penicilina em doses adequadas, a queda dos títulos maternos e o início do tratamento até 30 dias antes do parto.

Setor de Provimento e Acompanhamento de Pessoal em Saúde

Uberlândia, 19 de Abril de 2018.